

# Les quinze mousses les plus fréquentes de Suisse

Les espèces sont ordonnées de gauche à droite et de haut en bas selon leur fréquence décroissante. Celle-ci est calculée sur la présence de l'espèce dans env. 1200 relevés standardisés répartis régulièrement sur tout le territoire suisse.



**Hypnum cupressiforme** Hedw.  
Principalement forêts, mais aussi beaucoup d'autres milieux - sur le bois, la roche et les écorces. Collinéen - alpin; fréquence relative: 17,5 %



**Brachythecium rutabulum** (Hedw.) B.S.G.  
Forêts, prairies, rives - sur le sol, le bois pourri et la roche. Collinéen - alpin; fréquence relative: 13,5 %



**Dicranum scoparium** Hedw.  
Surtout forêts et landes à arbustes - sur le sol, la roche et les écorces. Collinéen - alpin; fréquence relative: 11,5 %



**Lophocolea heterophylla** (Schrad.) Dum.  
Forêts - sur le bois pourri et les écorces. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 11 %



**Eurhynchium hians** (Hedw.) Sande Lac.  
Forêts, prairies, champs - sur le sol. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 10 %



**Tortella tortuosa** (Hedw.) Limpr.  
Principalement forêts - sur la roche calcaire. Collinéen - alpin; fréquence relative: 10 %



**Ctenidium molluscum** (Hedw.) Mitt.  
Forêts, prairies sèches et bas marais - sur roche calcaire surtout. Collinéen - alpin; fréquence relative: 9,5 %



**Fissidens taxifolius** Hedw.  
Surtout forêts - sur le sol. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 9,5 %



**Schistidium apocarpum** s. l. (Hedw.) B.S.G.  
Rochers découverts ou ombragés - sur les murs et les roches calcaires. Collinéen - alpin; fréquence relative: 9 %



**Plagiochila asplenioides** (L.) Dum.  
Principalement forêts et autres milieux ombragés - sur le sol et la roche calcaire. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 8 %



**Polytrichum formosum** Hedw.  
Forêts - sur le sol. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 8 %



**Rhytidiadelphus triquetrus** (Hedw.) Warnst.  
Forêts, prairies d'altitude, landes - sur le sol. Montagnard - subalpin; fréquence relative: 8 %



**Brachythecium velutinum** (Hedw.) Schimp.  
Surtout forêts - sur le bois pourri, le sol et les roches. Collinéen - alpin; fréquence relative: 8 %



**Plagiommium undulatum** (Hedw.) T. Kop.  
Milieux ombragés, principalement forêts, mais aussi prairies urbaines - sur le sol. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 8 %



**Metzgeria furcata** (L.) Dum.  
Forêts - sur les écorces et la roche. Collinéen - subalpin; fréquence relative: 8 %

